

WILDE VOGELS



Wanneer heeft een vogel hulp nodig:

In principe heeft elke vogel die je kunt pakken hulp nodig. Ze zijn dan verzwakt of ziek en redden het niet in de natuur.

Jonge vogel met weinig of geen veren:

Als je een zeer jonge vogel hebt gevonden, probeer dan eerst of het nest nog te vinden is (vaak net boven de vogel zelf) en kijk of het terug te plaatsen is. Als dat niet lukt, kan het dier naar het vogelasiel worden gebracht. Als je dit niet zelf kunt doen kun je de dierenambulance bellen.



Een jonge vogel kan zich zelf niet warm houden en daarom is het van belang dat het dier niet te veel afkoelt. Dit kan door het in je handen te houden. Maar je kunt ook een kruik of twee flessen vullen met warm water (niet heet) en deze omwikkelen met een handdoek. Aan het water in de kruik of fles mag je je niet kunnen verbranden! Een temperatuur net boven lichaamstemperatuur is goed.

Doe vervolgens de vogel in een andere handdoek of keukenpapier en leg het op de kruik of flessen. Het dier krijgt nu warmte en blijft op zijn plaats.

Jonge vogel met veren:

Ook bij de bevederde jonge vogels geldt dat de vogelouders de beste zorg kunnen bieden. Als het nest niet meer is te vinden en het dier loopt niet het gevaar door een kat te worden gegrepen, kan het rustig blijven zitten. De ouders zullen steeds langs komen om het jong te verzorgen. Als dat niet het geval is moet het naar het vogelasiel.



Vogel tegen het raam:

Als een vogel tegen het raam vliegt gebeurt het vaak dat het dier versuft op de grond blijft liggen. Het beste wat je kunt doen is om de vogel in een klein doosje te zetten en deze af te sluiten (klein kiertje voor lucht open laten). Zet de doos met de vogel er in op een donkere en rustige plek. Maak na een uur voorzichtig de doos open en kijk hoe het dier er voor staat. Meestal is het weer kiplekker en kan buiten worden los gelaten.



Soms is er geen verbetering en kun je het naar het vogelasiel brengen. Als je zelf geen vervoer hebt, kun je de dierenambulance bellen. Het is ook nog mogelijk dat de vogel is overleden. In dat geval kun je het dier begraven of je stopt het in de groene kliko. Als dat niet mogelijk is bel je de dierenambulance, zij zullen dan het dier naar de destructie brengen.

Uitgehongerde vogel:

Als een vogel is uitgehongerd kan het niet meer vliegen. De vliegspieren zijn dan bijna helemaal weggeteerd. De vliegspieren zitten vast aan de vleugels en lopen via de borst naar het borstbeen. Op de foto is het rood omcirkelde deel het borstbeen. De vliegspier is de grootste spier van een vogel (een kipfilet is eigenlijk de vliegspier van de kip). Als bijna alleen het borstbeen is te voelen is het dier ernstig verzwakt en moet het snel naar het vogelasiel, anders heeft het nog maar een paar uur tot dagen te leven.



Vogel met een botbreuk:

Voor de meeste vogels zijn de vleugels en de poten zeer belangrijk, als daar wat aan mankeert is de kans groot dat het dier snel zal verhongeren of worden aangevallen door een kat of hond.

Het vogelasiel heeft in het verleden vaak geprobeerd om een dergelijk dier te redden door de breuk te spalken, maar dat is nooit succesvol geweest.

Daarom wordt een vogel met een breuk meestal geëuthanaseerd. Als je een vogel met een botbreuk hebt gevangen, bel dan de dierenambulance. Zij kunnen het dan naar de dierenarts brengen om het in te laten slapen. Van een grote watervogel zoals een zwaan of gans kan soms het gebroken deel van de vleugel worden geamputeerd, maar dat wordt alleen gedaan als er daarna een beschermde omgeving beschikbaar is.



Dode vogels:

Dode vogels kunnen begraven worden of in de groene kliko worden gedaan. Als dat niet mogelijk is kan de dierenambulance het dier ophalen en het naar de destructie brengen.



Vogelasiel (wildopvang) de Paddestoel: 0223-620586

Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet: 0229-591856

Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon: 06-51697115